

Тесты по циклу: Психотерапия

1. .Суть психотерапия по В.Е.Рожнову(1985):
 - 1) лечение психогенных душевных расстройств и соматических расстройств с невротическими проявлениями
 - 2) комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств исключительно на психику больного, в отличие от лекарственного лечения, воздействующего на тело
 - 3 воздействие с помощью психических средств одного человека на другого
 - 4 ни одно из перечисленного не отражает сути психотерапии
2. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985)..
 - 1 общей и частной психотерапии
 - 2 врачебной этики
 - 3 общей и специальной психотерапии
 - 4 психотерапии, направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на создание охранительно-восстановительного режима, исключая психическую травматизацию и атрогению, и психотерапии, использующей специальные методы (методики)
3. К основным видам (методам) частной психотерапии относится все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985)...
 - 1 рациональной терапии
 - 2 модификации аутогенной тренировки по Клейнзорге и Клюбмбиесу, прогрессирующей релаксации Джекобсона
 - 3 внушения в бодрствующем состоянии и гипнозе
 - 4 групповой психотерапии
4. В известную психотерапевтическую триаду Бехтерева входят все следующие моменты, кроме (В.Е.Рожнов - ред., 1985)...
 - 1 когнитивной беседы по Беку и анализа невротического конфликта
 - 2 разъяснительной беседы с группой больных
 - 3 гипноза
 - 4 обучения самовнушению
5. Гуманистические тенденции отечественной медицины прошлого века связаны прежде всего с именами (В.Е.Рожнов - ред., 1985)...
 - 1 Мудрова и Дядьковского
 - 2 Семиглазова
 - 3 Втюрина
 - 4 Вольфсона
6. Вся совокупность высшей нервной деятельности человека включает следующие основные инстанции, кроме (И.П.Павлов, 1933)...
 - 1 ближайшей к полушариям подкорки с ее сложнейшими безусловными рефлексами, влечениями, эмоциями
 - 2 больших полушарий головного мозга без лобных долей
 - 3 полушарий мозжечка, теменных долей больших полушарий, без мозолистого тела
 - 4 лобных долей больших полушарий
7. К основным свойствам нервной системы относятся все перечисленные, кроме (И.П.Павлов, 1935) ..
 - 1 силы основных нервных процессов - раздражительного и тормозного,
 - 2 подвижности основных нервных процессов
 - 3 инертности основных видов психической деятельности и устойчивости постоянно составляющих целостную нервную деятельность основных нервных процессов
 - 4 равновесия основных нервных процессов
8. Закон взаимной индукции состоит (И.П.Павлов, 1935):
 - 1 в том, что эффект положительного условного раздражителя делается меньше, когда последний применяется сейчас же или скоро после концентрированного тормозного, так же как и эффект тормозного оказывается более слабым после концентрированного положительного
 - 2 в извращении эффектов: условный положительный раздражитель остается совсем без эффекта, а отрицательный обнаруживает ультрапарадоксальную фазу

- 3 в том, что масса разнообразнейших пунктов в коре, раздражительных и тормозных, относящихся как к внешнему миру, так и к внутреннему, перемежается в борьбе сторожевых и дежурных начал
- 4 ни одно из перечисленных

9. Под доминантой (состоянием доминанты) по А.А.Ухтомскому (1927) понимают все перечисленное, кроме:

- 1 растревоженного, разрыхленного места нервной системы, своего рода "съемки", к которой пристаёт все нужное и ненужное, из чего потом делается подбор того, чем обогащается опыт
- 2) повсюду господствующего возбуждения посреди прочих, и повсюду она есть продукт суммирования возбуждений
- 3 "оттока" возбуждений, как некоей энергии, от центров, впадающих в торможение, к центрам, наиболее возбуждающимся; заключается в том, что чрезвычайный "заряд" возбуждения в центрах разрешается от малейшего добавочного стимула
- 4 характеризуется тем, что самые различные по месту приложения раздражения вызывают в первую голову реакции в одном определенном направлении

10. По П.К.Анохину (1968), возможно выделить следующие формы афферентных воздействий, отправляясь не от качества воздействующей энергии, а от места и значения в формировании целостных поведенческих актов организма, кроме:

- 1 дистантной и тактильной афферентации
- 2 обратной афферентации
- 3 пусковой афферентации
- 4 обстановочной афферентации

11. Афферентный синтез сказывается в том, что (П.К.Анохин, 1968)...

- 1 внешний раздражитель, поступая в форме возбуждения в центральную нервную систему, линейно распространяется в ней в соответствии с классической рефлекторной теорией
- 2) возбуждения от условного стимула вступают во взаимодействие, единство с теми возбуждениями, которые были подготовлены совокупностью предшествующих раздражений, в виде системы предпусковых возбуждений. Экспериментальное животное, как и человек
- 3 поведенческий акт всегда удовлетворяет какую-то потребность организма, или нутритивную или идеальную
- 4 условный раздражитель представляет собой абсолютное и единственное в получении условной реакции

12. Принцип дополнительности Нильса Бора выражается в том, что (И.М.Фейгенберг, 1986)...

- 1 различные результаты, полученные различными способами наблюдения, рассматриваются не как противоречивые, а как дополняющие друг друга
- 2 одно наблюдение дает один результат, другое - иной, и в этом состоит истина
- 3 в психологии сплошь и рядом невозможно отделить наблюдаемое явление от наблюдателя, невозможно однозначно провести границу между ними
- 4 всё перечисленное

13. Симпатическая система в отличие от парасимпатической (Д.Хэссет, 1978)...

- 1 восстанавливает запасы энергии в организме
- 2 осуществляет катаболизм
- 3 осуществляет анаболизм
- 4 дает более кратковременную и более локальную активацию

14. Особого внимания заслуживают следующие психотерапевтические подходы (Б.Д.Карвасарский, 1985)...

- 1 психоанализ и клиническая психотерапия
- 2 личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия, методы преимущественно симптоматической психотерапии
- 3 эмоционально-стрессовая психотерапия
- 4 правильно б) и в)

15. К основным общим факторам в психотерапевтических воздействиях, без знания которых едва ли возможен правильный учет эффективности психотерапии, относится все перечисленное, за исключением (Б.Д.Карвасарский, 1985)...

- 1 оперативной модификации поведения больного за счет одобрения или неодобрения со стороны психотерапевта и повторяющегося коррективного эмоционального опыта в отношениях с психотерапевтом
- 2 приобретения социальных навыков на модели психотерапевта
- 3 убеждения и внушения, явного или скрытого

- 4 характерологической совместимости психотерапевта с пациентом (подобие, созвучие в каких-то гранях их характерологических радикалов) и бескорыстной доброты психотерапевта
16. Основными клиническими предпосылками широкого и эффективного применения психотерапии являются (Б.Д.Карвасарский, 1985)...
 - 1 клиническое мироощущение и диалектико-материалистическое движение мысли психотерапевта
 - 2 прямое использование психотерапии в большом круге заболеваний, в этиопатогенезе которых психическому фактору принадлежит определяющая или весьма существенная роль
 - 3 лечебно-профилактическое значение психотерапии с учетом психосоциальных реакций на соматические болезни, их последствия, влияния специфических расстройств на психологическое функционирование индивида, его поведение и прочее
 - 4 правильно б) и в)
17. Анализ результатов психофизиологических, биологических исследований, проведенных в клинике неврозов и психотерапии Института Бехтерева, убеждает в том, что (Б.Д.Карвасарский, 1985)...
 - 1 имеется отчетливая зависимость между степенью выраженности q-ритма на ЭЭГ, интенсивностью КГР и ЭЭГ-реакцией на эмоционально значимые слова, повышением содержания адреналина и норадреналина, а также высокими показателями клинических субшкал актив
 - 2 благотворные изменения, происходящие с невротиком, обнаруживаются в обмене холестерина
 - 3 лечебный сдвиг регистрируется только на вегетосоматическом уровне
 - 4 у больных неврозами обнаруживаются определенные изменения в системе эндорфинов, энкефалин
18. Особенность клинической психотерапии состоит в том, что (М.Е.Бурно, 1989)...
 - 1 истинной, подлинной психотерапией считается лечение внушением, гипнозом, разъяснением и убеждением
 - 2 это лечение довольно тяжелых больных в клинике или врачебной амбулатории (в отличие от психокоррекции)
 - 3 психотерапевт с глубоким доверием, вниманием исследует, как лечит сама природа, помогая ей защищаться совершеннее; будучи клиницистом, сообщает свое с психотерапевтическое воздействие клинической картины
 - 4 для клинического психотерапевта имеет смысл вопрос, какой психотерапевтический метод сильнее, лучше вообще
19. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)...
 - 1 соотношения звуков и слов (созвучия, сходства слов, употребительные словесные ассоциации)
 - 2 соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
 - 3 утомления, рассеянности
 - 4 противодействия двух различных измерений
20. К критериям психиатрического клиницизма относится все перечисленное, кроме (М.Е.Бурно, 1989):
 - 1 работы с достаточно выраженными клиническими душевными расстройствами
 - 2 убежденности в эволюционном единстве всего живого, что ясно видится и во многих душевных расстройствах
 - 3 серьезного, насущного внимания к личностной почве
 - 4 осознанного ощущения единства дела и духа и отчетливого видения-чувствования биологической базы во всякой, даже самой одухотворенно-тонкой душевной патологии (первичность материи по отношению к духу, не существующему без материи)
21. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)..
 - 1 соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
 - 2 утомления, рассеянности
 - 3 возбуждения, расстройства внимания
 - 4 противодействия двух различных измерений
22. Аналитическая терапия отличается от гипнотической тем, что (З.Фрейд)..
 - 1 направлена на устранение внутренних сопротивлений
 - 2 здесь врач помогает пациенту внушением, действующим в воспитательном смысле; аналитическая терапия работает над самим перенесением, устраняет то, что ему противодействует

- 3 совершенно не использует силу внушения
4 правильно а) и б)

23. Символ по К. Юнгу -это..

- 1 знак, обозначающий объект, к которому относится
- 2 любая эмблема, знак различия
- 3 слово или изображение, подразумевающее нечто большее, чем их непосредственное и очевидное значение; термин, имя или изображение, которые могут быть известны в повседневной жизни, но обладают специфическим добавочным значением к своему обычному см
- 4 правильно б) и в)

24. "Комплексы" - это (К.Юнг) ...

- 1 аффекты, заряженные тягостным переживанием своей неполноценности
- 2 фрагменты обостренного самолюбия, не могущего найти выхода, разрядиться, реализующиеся в агрессивные поступки или в невротические симптомы
- 3 психические фрагменты, выделившиеся в отдельные констелляции образов и идей в результате психических травм или каких-либо конфликтов, одновременно несовместимых друг с другом тенденций; подавленные эмоциональные содержания, которые могут вызвать по
- 4 постоянно сдерживаемая осознанная, ситуационно обусловленная неприязнь к кому-либо

25. Архетипы - это все перечисленное, за исключением (К.Юнг):

- 1 "архаических остатков" (З.Фрейд)
- 2 "первобытных образов" (К.Юнг)
- 3 часто наблюдаемых в снах элементов, не индивидуальных и не выводимых из личного опыта сновидца
- 4 некоторых вполне определенных мифологических образов и мотивов

26. К критериям психиатрического клиницизма относится все перечисленное, кроме (М.Е.Бурно, 1989)...

- 1 работы с достаточно выраженными клиническими душевными расстройствами
- 2 убежденности в эволюционном единстве всего живого, что ясно видится и во многих душевных расстройствах
- 3 серьезного, насущного внимания к личностной почве
- 4 осознанного ощущения единства дела и духа и отчетливого видения-чувствования биологической базы во всякой, даже самой одухотворенно-тонкой душевной патологии (первичность материи по отношению к духу, не существующему без материи)

27. Основными понятиями психодрамы являются все перечисленные, за исключением (К.Рудестам, 1990)...

- 1 ролевой игры
- 2 спонтанности
- 3 катарсиса
- 4 театрального сомнамбулизма

28. Психология, основывавшаяся прежде на изучении осязаемых стимулов,реакций, доступных наблюдению, зримых положительных подкреплений и изучающая теперь такие эфемерные, расплывчатые туманности, как переживание опыта, структура "Я", становление (К.Роджерс)...

- 1 закопается в субъективизме, не имеет будущего
- 2 неизбежно встречает ловушки, которые таят в себе рассуждения по аналогии; напоминает путь развития физических наук
- 3 является теперь психоаналитической психологией
- 4 является теперь бихевиориальной психологией

29. Благодаря субъективным конструктам смогли появиться (К.Роджерс)..

- 1 поведенческая теория
- 2 патологическая физиология
- 3 теория относительности, теория высвобождения атомной энергии и теория космического пространства
- 4 правильно в) и г)

30. Гештальттерапия разработана на основе (К Рудестам, 1990)..

- 1 поведенческой психотерапии
- 2 синтетической психотерапии Вольфганга Кречмера
- 3 психоанализа и экзистенциальной философии, противления психологическому изменению

4 правильно а) и б)

31. Основные понятия гештальттерапии - это (К.Рудестам, 1990)..
- 1 осознание и сосредоточение на настоящем; противоположности: отношение фигуры и фона
 - 2 телесная медитация
 - 3 генетически обусловленные характерологические структуры
 - 4 правильно а) и в)
32. Функции защиты включают в себя все перечисленное, кроме (К.Рудестам 1990)...
- 1 патологического слияния
 - 2 ретрофлексии
 - 3 резиньяции
 - 4 интроекции
33. Целью гештальттерапии является (К.Рудестам, 1990)..
- 1 анализ вместе с членами группы своего индивидуального отношения к живой и неживой природе
 - 2 изучение вместе с участниками этого процесса психологических и логических закономерностей в группе
 - 3 изучение вместе с участниками различных характерологических вариантов, чтобы иметь возможность прогнозировать переживания и поведение партнера в различных ситуациях
 - 4 пробуждение организмических процессов участников путем поощрения расширения осознания и продвижения по направлению достижения зрелости
34. К основным методам (упражнениям) гештальттерапии относятся все перечисленные, за исключением (К.Рудестам, 1990)...
- 1 упражнений на расширение осознания
 - 2 изучения литературы по физиологии, психологии
 - 3 интеграции противоположностей
 - 4 усиления внимания к чувствам
35. Основателем гештальтподхода к групповой работе считается (К.Рудестам, 1990)...
- 1 Абрахам Маслоу
 - 2 Курт Левин
 - 3 Карен Хорни
 - 4 Фредерик Перлз
36. Помощь психотерапевта пациенту в его поисках смысла включает (В.Франкл)...
- 1 указать отчетливо пациенту на его ценности, подчеркнуть ему, дать ему его смысл
 - 2 психотерапевт должен дать ясно понять пациенту, что знает, что истинно ценно, а что нет, в чем заключается истинный смысл
 - 3 внушить пациенту то, что он, психотерапевт, истинно знает как никто, - что есть добро, что - зло
 - 4 пациента следует направить к его собственной совести
37. Логотерапия - это попытка (В.Франкл)..
- 1 придать смысл жизни пациенту
 - 2 помочь пациенту разобраться в характерах людей по особенностям их речи и на основании этого строить с людьми добрые дружеские отношения, смягчая свою душевную напряженность
 - 3 помочь пациенту спонтанно найти свой смысл
 - 4 придать цель жизни пациенту
38. Следующие специфически человеческие проявления, включенные в инструментарий логотерапии, отличают ее от психоанализа и поведенческой психотерапии (В.Франкл)..
- 1 способность к осознанию своих тягостных, аморфных переживаний
 - 2 способность переучиваться
 - 3 способность приводить в действие новые психодинамические процессы
 - 4 способность к самоотстранению, самотранценденция
39. Клинический психотерапевт ведущим психотерапевтическим методом считает (М.Е.Бурно, 1989)..
- 1 психоанализ, эмоционально-стрессовую психотерапию
 - 2 экзистенциальный анализ
 - 3 гипнотерапию и самовнушение
 - 4 ничего из перечисленного

40. Внушение обычно действует тем сильнее, чем
- 1 критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
 - 2 спокойнее, будничнее держится психотерапевт
 - 3 тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время
 - 4 сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
41. Самыми известными способами определения внушаемости являются все перечисленные, за исключением:
- 1 "падения назад"
 - 2 протреники и способа Бехтерева с остро отточенным карандашом
 - 3 внушения одеревянения рук, сцепленных в "замок"
 - 4 способа Буля с магнитом
42. Известными способами внушения в бодрствующем состоянии являются все перечисленные, за исключением:
- 1 способа И.С.Сумбаева
 - 2 приема П.И.Буля в затемненном помещении с вызыванием устрашающих образов
 - 3 внушения резким тоном с предварительным пристальным взглядом на пациента во время беседы
 - 4 способа с предварительным внушением "полного безволия"
43. Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)..
- 1 условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и
 - 2 вид онейроидного помрачения сознания
 - 3 состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией
 - 4 искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку
44. Фракционный метод гипнотизации (по Фохту) состоит в том, что:
- 1 погружение внушением в гипноз время от времени прерывается и пациенту предлагается описать свои ощущения для того, чтобы психотерапевту знать, как быть дальше
 - 2 внушение разбивается на три фракции - для погружения в I степень, во II и III степени
 - 3 фракционно пациент обнаруживает при погружении в гипноз то каталепсию, то восковую гибкость
 - 4 в этом способе гипнотизации ясно обнаруживается феномен "зубчатого колеса"
45. Методика длительного гипноза-отдыха (по К.И.Платонову) заключается в том, что:
- 1 пациент отдыхает в гипнотическом состоянии 1-2 часа
 - 2 пациент отдыхает в гипнотическом состоянии, оставленный в палате психотерапевтом, 4-5 часов
 - 3 пациент отдыхает в гипнозе (без психотерапевта рядом) 3-4 часа
 - 4 пациент отдыхает в гипнозе до 20 часов в сутки
46. Методика удлиненной гипнотерапии (по В.Е.Рожнову) заключается в том, что:
- 1 группа пациентов погружается в гипноз-отдых, продолжающийся от часа до 5 часов
 - 2 психотерапевт в течение часа непрерывно проводит пациенту лечебное внушение в гипнозе
 - 3 врач, проводящий психотерапевтический прием, в отдельной комнате погружает пациента в гипноз и в течение 2 часов каждые 15 минут старается углубить гипнотическое состояние
 - 4 лечебное внушение в гипнозе проводится группе пациентов в течение 2-4 часов по 2-3 мин каждые 15-20 мин
47. Особенность методики эмоционально-стрессовой гипнотерапии (по В.Е.Рожнову) заключается в том, что:
- 1 у больных алкоголизмом вызывается внушением душевное напряжение с неприязнью к спиртному
 - 2 техника гипнотизации основывается на эмоционально-смысловых суггестивных формулах, глубоко затрагивающих личность гипнотизируемого; особое значение приобретает интонация произносимых врачом слов: их задушевность, теплота, суровость негодования, т

- 3 пациент максимально интенсивно охвачен здесь целью методически преодолеть свою болезненную симптоматику
- 4 в гипнозе проводится мотивированное сократическое внушение

48. Гипнотерапия противопоказана всем перечисленным больным, кроме:

- 1 пациентов, у которых гипнотический транс провоцирует возникновение судорожного припадка
- 2 больных эпилепсией с припадками и больных, получающих одновременно талассатерапию
- 3 больных с бредовыми психотическими расстройствами
- 4 больных с лихорадкой

49. Теоретическими положениями прогрессирующей (прогрессивной) релаксации Джекобсона являются:

- 1 положение о церебронейромышечном круге
- 2 положение о том, что многократное сознательное повторение привычного болезненного действия избавляет от него
- 3 в сновидениях происходит серьезное отреагирование переживаний
- 4 отреагирование серьезно помогает, если эмоциональное воспроизведение прошлого сочетается с участием со стороны врача

50. Техника релаксации по Джекобсону включает в себя следующие основные упражнения..

- 1 лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления
- 2 согнуть и разогнуть мышцы пальцев ног шесть раз подряд, обращая внимание на ощущения напряжения-расслабления
- 3 научиться расслаблять мышцы языка, смягчая этим тревожную напряженность

51. Рациональную психотерапию Дьюба иначе принято называть всеми перечисленными терминами, кроме:

- 1 перевоспитания пациента путем развития и укрепления его ума
- 2 убеждения посредством диалектики
- 3 сократического метода
- 4 целесообразной и аналитической терапии

52. Существом классической рациональной психотерапии Дьюба является все перечисленное, за исключением:

- 1 безимперативного внушения в бодрствующем состоянии
- 2 живого, диалектического взаимодействия внушения с отвлечением в психотерапевтической работе с пациентом
- 3 лечебного доказательства
- 4 сочетания разъяснения с эмоциональным внушением наяву

53. Рационально-эмоциональная терапия Эллиса представляет собой:

- 1 один из способов когнитивного реструктурирования; момент когнитивно-бихевиорального развития ортодоксальной поведенческой терапии
- 2 способ диагностики иррациональных убеждений и систематического замещения их рациональными представлениями
- 3 "атаку" и разрушение иррациональных компонентов мышления и поощрение замещения их такими более разумными идеями и выводами, как "стоящий человек должен быть компетентным, иметь успех во всех случаях" и т.д.
- 4 правильно а) и б)

54. Когнитивная терапия Бека основывается на всех следующих положениях, кроме:

- 1 депрессия возникает тогда, когда человек неадекватно интерпретирует мир и себя, не видит альтернативных объяснений и решений
- 2 тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта
- 3 пациенту следует проанализировать свой способ мышления, понимания вещей как один из многих возможных наряду с более адекватными по отношению к действительности
- 4 основной метод работы психотерапевта - формулирование вопросов, как это делал Сократ

55. Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением:

- 1 дидактического
- 2 аналитического
- 3 поведенческого
- 4 восточно-иероглифического

56. Особенности психотерапевтической работы "группы встреч" (Роджерс) состоят в том, чтобы:

- 1 познавать себя и других в более или менее интуитивно-недирективно в живом общении; помогать товарищу в его житейском конфликте общественным мнением группы
- 2 познавать характеры участников группы на базе психологически-типологического просвещения, воспитания; клинически направлять мнение группы в свободном откровенном самовыражении участников группы
- 3 в непосредственном, живом, глубоком взаимодействии друг с другом рассказывать свое сокровенное, дабы каждый участник группы познавал себя и окружающих полнее, чем в обычных домашних или служебных контактах, и научился лучше относиться к другим людям
- 4 правильно а) и г)

57. Роджерс не считает, что:

- 1 одна из важнейших особенностей его групп - максимально недирективный стиль руководства
- 2 экспликация негативных чувств - важный показатель создания в группе атмосферы свободы и безопасности
- 3 необходим спонтанный разговор на значимые для членов группы темы, выражение истинных чувств, возникающих "здесь и сейчас"
- 4 поведение человека детерминировано важнейшими организмическими потребностями, которые выступают как "фигуры" на фоне перцептивного поля

58. Определяющими характеристиками группы являются (по Слуцкому и Цапкину) все перечисленное, за исключением:

- 1 непосредственного межличностного взаимодействия ее членов
- 2 такого рода объединения людей, как зрители на спектакле, покупатели в очереди
- 3 общности цели и деятельности
- 4 внутренней расчлененности функций и групповых ролей

59. Психогимнастика - эта форма психотерапии, при которой:

- 1 участники группы выражают эмоции только с помощью мимики
- 2 пациенты учатся понимать чувства, мысли без помощи слов и движений
- 3 пациенты выполняют различные упражнения, в том числе направленные на развитие внимания и как невербально обратить на себя внимание группы, пациенты получают, в частности, пантомимические задания, выполнение которых обсуждается всей группой
- 4 правильно а) и г)

60. Проективный рисунок в группе (по Карвасарскому) есть психотерапевтический прием:

- 1 для выявления в группе трудно объяснимых проблем, переживаний пациента
- 2 для выяснения, понимания пациентом его определенного характерологического типа
- 3 для психотерапевтического изучения понимания пациентом характеров других участников группы
- 4 правильные а) и в)

61. Особенности групповой эмоционально-стрессовой психотерапии в клинике пограничных состояний (по Слуцкому) являются все, кроме

- 1 принципа индивидуального подхода к больному в групповом лечении пациентов; синдромологического анализа
- 2 оценки характерологических особенностей и клинической динамики состояния каждого члена группы
- 3 принципа клинического подхода как наиболее важного здесь, основного принципа; "групповой клинической динамики"
- 4 преподавания пациентам элементов клинической психиатрии

62. В групповой эмоционально-стрессовой психотерапии (по Слуцкому) возможно выделить следующие уровни сложности задачи, кроме

- 1 первый уровень - отработка элементов коммуникативной деятельности
- 2 второй уровень - тренировка нарушенных функций

- 3 третий уровень - создание ориентированных на будущее устойчивых адекватных форм взаимодействия с реальными объектами действительности, переоценка иерархии значимых ценностей
 - 4 четвертый уровень - самовыражение, самораскрытие, выявление эмпатии, сопереживания; моделирование эмоционально напряженных фрустрирующих ситуаций, требующих максимального включения систем нервно-психической сферы
63. При групповой эмоционально-стрессовой психотерапии (по Слущкому) в одну группу, соблюдая принцип пропорциональности, возможно включить пациентов со следующей патологией:
- 1 невротизм, невротическое развитие, психопатии
 - 2 вялотекущая (малопрогрессирующая) шизофрения с невротоподобными расстройствами
 - 3 резидуальная органическая неполноценность
 - 4 все перечисленное
64. В работе с группами в процессе групповой эмоционально-стрессовой психотерапии (по Слущкому) прослеживаются следующие основные фазы их развития:
- 1 адаптационная
 - 2 агрессивная, структурированная
 - 3 фрустрационная и реализационная
 - 4 правильно а) и в)
65. В процессе патогенетической коллективной психотерапии (по Либиху) с целью сблизить больных применяются следующие приемы, кроме:
- 1 поиска общего, типического у больных группы
 - 2 создания приемов активного противодействия болезни (по Н.В.Иванову), лечебной перспективы
 - 3 анонимного обсуждения, "психотерапевтического зеркала"
 - 4 приема "фигуры" и "фона"
66. Характерными стилями взаимодействия в "невротических семьях" (по Мягер и Мишиной) являются все перечисленные, за исключением:
- 1 соперничества
 - 2 агрессии и интериоризации
 - 3 невротического взаимного дополнения
 - 4 изоляции
67. "Стереоскопическая" техника лечения супружеских пар (по Мягер и Мишиной) предполагает, что:
- 1 каждого пациента супружеской пары ведет "свой" терапевт, проблемы же обсуждаются вчетвером; объединение усилий врача и психолога, как наиболее оптимальное
 - 2 обязательное совпадение пола психотерапевта и его пациента
 - 3 объединение усилий двух психотерапевтов-врачей разного пола, но примерно одинакового возраста - как оптимальное
 - 4 желание пациента духовно вознаграждать психотерапевта и наоборот
68. Аспектами функционирования семьи известной "модели Мак-Мастерса" являются все перечисленные, за исключением (Э.Г.Эйдемиллер и В.В.Юстицкий, 1990)...
- 1 коммуникативных характеристик
 - 2 аффективной вовлеченности
 - 3 "поведенческого контроля"
 - 4 сексуальной утонченности
69. Существенные особенности эмоционально-стрессовой психотерапии (по Рожнову) состоят в том, что она:
- 1 обязательно приводит пациента в состояние достаточно сильного, острого эмоционального напряжения
 - 2 пробуждает в пациенте насущную потребность самоусовершенствования, дабы утвердить себя в собственных глазах и во мнении окружающих; обращена "к духовным компонентам личности"
 - 3 всеми своими методиками направлена к выработке душевного и физического отвращения к пьянству, алкоголю
 - 4 противопоказана соматически ослабленным, хрупким пациентам
70. Яроцкий полагал, что:
- 1 материалистическое мировоззрение отрицает реальное существование духовных и нравственных сил, заложенных в душе человека

- 2 материалистическое мировоззрение повинно в том, что медицина нравственные силы души игнорирует
- 3 суть лечения - это "поставить больного в такую материальную обстановку, которая соответствовала бы его потребностям, индивидуальным свойствам" и "всеми силами поднять яркость, интенсивность его личности"
- 4 врачи должны с помощью различных психоаналитических концепций добиваться полного нравственного перерождения личности пациента

71. Джерин и Гоклер полагали, что:

- 1 нельзя вылечить "истеричного" или "неврастеника" рассуждениями или силлогизмами
- 2 одно только чувство создает атмосферу доверия, без которого не может быть психотерапии
- 3 нет рассуждения, оказывающего действительное влияние
- 4 все перечисленное

72. Эмоциональный стресс (по Селье) - это...

- 1 нервное вредоносное напряжение
- 2 неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование, общий адаптационный синдром
- 3 вид дистресса
- 4 защитно-приспособительное напряжение организма, вызванное эмоциональным стрессором

73. Холотропная дыхательная техника - это (С.Гроф)..

- 1 методика применения галлюциногенов при погружении в транс
- 2 методика применения психоделических растений при лечении депривацией сна
- 3 методика, соединяющая в себе дыхательную гимнастику йогов и музыкотерапию
- 4 безлекарственное соединение действия гипервентиляции и музыки

74. Все следующие "спусковые механизмы" могут побуждать к возникновению "холотропных состояний сознания", кроме (С.Гроф):

- 1 изнасилования
- 2 тяжелой утраты
- 3 родов
- 4 отдыха в тени деревьев

75. Все следующие аспекты психотерапевтической теории и практики затрагиваются различиями между холотропной моделью и традиционными представлениями в психиатрии, кроме (С.Гроф):

- 1 природы процесса исцеления
- 2 роли терапевта
- 3 роли пациента
- 4 гипноза животных

76. Существо "ортодоксальной школы" психосоматической медицины состоит во всем перечисленном, за исключением (Ю.М.Губачев и Е.М.Стабровский, 1981):

- 1 психоаналитического толкования влечений, душевных движений человека в их отношении к соматической патологии
- 2) представления о сексуальном влечении, желаниях, стремящихся к своему осуществлению, но встречающих на пути контролирующие душевные преграды и вследствие этого трансформирующихся в вегетативную патологию по механизму истерической конверсии
- 3 представления о превращении вытесненных влечений, желаний в символически оформленную соматическую патологию
- 4 застойного душевного напряжения, "горящих" в душе конфликтов, которые могут порождать функциональную вегетативную патологию; представления об особой роли невроза как обязательной функциональной стадии соматических болезней

77. Метод гипнотерапии в психотравмирующей обстановке для лечения больных со страхом замкнутого пространства и темноты (по Слуцкому) предполагает:

- 1 гипнотарий, оборудованный двусторонней радиосвязью для беседы с пациентами и пребывание в нем пациента закрытым "на ключ" (звук закрывающейся защелки)
- 2 постепенное затемнение гипнотария до абсолютной темноты во время каждого гипнотического сеанса
- 3 индивидуальную гипнотерапию в абсолютно темном гипнотарии с самого начала сеанса

4 проведение сеансов-тренировок по 2 раза в день

78. Методика Слуцкого "имитация движения" (для больных со страхом езды в транспорте) предполагает

- 1 затемненную кабину с магнитофоном и диапроектором
- 2 переговоры с врачом только через двустороннюю радиосвязь
- 3 протренировочную зарядку в темноте
- 4 цветной портрет врача на экране в кабине

79. Патогенетическая психотерапия Мясищева предусматривает все перечисленное, за исключением....

- 1 применяется индивидуально
- 2 применяется в групповой форме
- 3 является основой для разработки систем личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии при алкоголизме и психозах
- 4 ставит главной своей целью - помочь пациенту полезно включиться в жизнь своими болезненными личностными свойствами

80. Особенности психиатрической клиники (по Ганнушкину) являются все перечисленное, за исключением...

- 1 рассказ о себе самого больного относится не к анамнезу, а к статусу
- 2 беседа с больным должна быть достаточно строгой, четкой, как можно менее субъективной, не должна выражать индивидуальность врача, должна выявлять лишь конкретные симптомы и синдромы; главный метод исследования больного - объективное исследование
- 3 врожденные, конституциональные особенности заболевшего имеют громадное значение
- 4 каждый пациент психиатрического учреждения должен многие годы после выписки поддерживать связь - лично или письменно со своим врачом

81. Физиологический принцип классификации психопатологических симптомов:

- 1 соответствует структуре рефлексорной дуги; своей теоретической основой имеет работы Сеченова по рефлексам головного мозга
- 2 своей теоретической основой имеет работы Аствацатурова о меридиональности
- 3 придает особое значение функциональному диагнозу
- 4 основывается на физиологическом (в свете учения о высшей нервной деятельности) понимании психопатологических симптомов

82. Синдром - это....

- 1 более, чем два симптома
- 2 множество симптомов
- 3 совокупность болезненных признаков
- 4 совместный "бег" симптомов, отражающий патогенез болезни

83. Раздражительная слабость - это....

- 1 характерное расстройство настроения у эпилептоидного психопата
- 2 половая слабость мужчин с дистрофическими расстройствами настроения
- 3 церебросклеротическая слезливость
- 4 раздражительность, легко истощающаяся, сопровождающаяся часто чувством вины, самообвинение

84. Астенический синдром - это...

- 1 пониженное настроение с чувством слабости
- 2 переживание чувства своей неполноценности
- 3 раздражительная слабость вместе с вегетативными дисфункциями
- 4 нарушения сна с тягостными переживаниями по этому поводу

85. Причина астенического, истинно невротического, синдрома...

- 1 в астеническом складе характера, выраженной вегетативной неустойчивости
- 2 в дурном воспитании ("золушка")
- 3 в длительных тягостных бессонницах
- 4 ни в чем из перечисленного

86. Гиперстенический вариант астенического синдрома конкретно обнаруживает себя обычно:

- 1 сонливостью
- 2 снижением либидо
- 3 слезливостью и несдержанностью
- 4 сенестопатиями

87. Гиперстезия - это....

- 1 субъективное обострение или субъективное извращение ощущений
- 2 усиленная (обостренная) болевая чувствительность
- 3 тягостное ощущение в бессоннице
- 4 ничего из перечисленного

88. Гипестезия конкретно обнаруживает себя обычно:

- 1 сложными обманами чувств
- 2 ослаблением либидо
- 3 яктацией
- 4 поверхностным прерывистым сном

89. Аффективная лабильность - это...

- 1 то же самое, что эмоциональная неустойчивость
- 2 склонность к дисфорическим взрывам
- 3 склонность к красочному воображению
- 4 то же самое, что питуитаризм

90. Тревога - это...

- 1 боязнь сиюминутного, настоящего
- 2 душевная напряженность с агрессивной готовностью
- 3 боязнь только того плохого, что может случиться в далеком будущем
- 4 ничего из перечисленного

91. Дисфория - это...

- 1 разновидность депрессии
- 2 тягостная, стойкая раздражительность
- 3 смешение страха, злобы, тоски
- 4 депрессия на органической почве

92. Эйфория - это....

- 1 все равно, что гипноманиакальное настроение; маниакальная неспособность здраво оценивать ситуацию
- 2 содержательная, остроумная веселость
- 3 малосодержательная, пустоватая веселость
- 4 по существу ажитированная аменция

93. Психотерапевтические и психокоррекционные воздействия включают в себя

Тактику:

- 1 "штурма", "паузы"
- 2 "позиционного давления"
- 3 "конфронтации"
- 4 всего перечисленного

94. Показаниями к проведению наркопсихотерапии являются:

- 1 пониженная внушаемость и гипнабельность
- 2 недостаточная контактность
- 3 отсутствие эффекта после проведения других психотерапевтических мероприятий
- 4 все перечисленные

95. К противопоказаниям к применению наркопсихотерапии относится все перечисленное, кроме:

- 1 острого гепатита
- 2 невротизов позднего возраста с нейро-эндокринными расстройствами
- 3 цирроза печени
- 4 кахексии

96. Можно выделить следующие разновидности наркопсихотерапии, кроме (по М.Э.Телешевской):

- 1 внушения на фоне кратковременного или же продленного неполного гексеналового наркоза
- 2 наркоаутосуггестивного метода
- 3 наркогипноза
- 4 метода многократных внутривенных введений гексенала

97. Сосредоточенность на настоящем ("здесь и теперь") - это контакт со всеми перечисленными зонами (Ф.Перлз), кроме:

- 1 внутреннего мира

- 2 внешнего мира
- 3 средней зоны (зона "фантазии")
- 4 все перечисленное

98. К индивидуальным методам психотерапии алкоголизма относятся все перечисленные, кроме:

- 1 рациональной психотерапии
- 2 ситуационно-психологического тренинга
- 3 внушения наяву
- 4 гипнотерапии

99. Групповыми методиками психотерапии алкоголизма являются все перечисленные, кроме:

- 1 гипнотерапии
- 2 функциональной тренировки
- 3 аутотренинга
- 4 ситуационно-психологического тренинга

100. К индивидуальным методам психотерапии алкоголизма относятся все перечисленные, кроме:

- 1 рациональной психотерапии
- 2 ситуационно-психологического тренинга
- 3 внушения наяву
- 4 гипнотерапии