

Тесты по циклу: Рефлексотерапия.

1. Янцы
 - 1 метод прижигания
 - 2 метод биопунктуры
 - 3 метод ауринулотерапии
 - 4 метод поверхностного игноукалывания
2. Маоцы проводится
 - 1 пальцем
 - 2 пучком игл (цветок)
 - 3 полынной сигарой
 - 4 методом одиночного укола
3. Мокса проводится
 - 1 пальцем рук
 - 2 металлическими пластинами
 - 3 полынной сигарой
 - 4 пучком игл
4. Признаки избыточности меридиана легких
 - 1 температура, жар в ладонях, звонкий кашель, боли в горле, бронхиальная астма
 - 2 хронические заболевания легких или заболевания с нарушением функции кожи, зуд, зябкость, хриплый кашель, боль в грудной клетке
5. Признаки недостаточности меридиана легких
 - 1 температура, жар в ладонях, звонкий кашель, боли в горле, бронхиальная астма
 - 2 хронические заболевания легких или заболевания с нарушением функции кожи, зуд, зябкость, хриплый кашель, боль в грудной клетке
6. Синдром избыточности меридиана толстой кишки
 - 1 боли в верхних конечностях, спине, животе, напряжении мышц шейно-затылочной области, вздутие живота, запоры
 - 2 понос, слабость в руках, бронхиальная астма
7. Синдром слабости меридиана толстой кишки
 - 1 боли в верхних конечностях, спине, животе, напряжении мышц шейно-затылочной области, вздутие живота, запоры, головокружение, озноб
 - 2 понос, слабость в руках, бронхиальная астма
8. Синдром избыточности меридиана желудка
 - 1 боли в области передней поверхности грудной клетки, желудка и ног, вздутие живота, отрыжка, запор, чувство голода, сухость во рту, возбуждение, язва желудка, зубная боль
 - 2 расстройство пищеварения (чувство полноты в животе, понос, рвота) онемение и чувство похолодания в области бедер, голеней, боли мышц живота, депрессия
9. Синдром недостаточности меридиана желудка
 - 1 боли в области передней поверхности грудной клетки, желудка и ног, вздутие живота, отрыжка, запор, чувство голода, сухость во рту, возбуждение, язва желудка, зубная боль
 - 2 расстройство пищеварения (чувство полноты в животе, понос, рвота) онемение и чувство похолодания в области бедер, голеней, боли мышц живота, депрессия
10. Признаки недостаточности меридиана селезенки-поджелудочной железы
 - 1 плохая память
 - 2 дневная сонливость
 - 3 отеки
 - 4 страсть к сладостям
11. Основные меридианы лечения заболеваний мочеполовой сферы
 - 1 почки
 - 2 печень
 - 3 желудок
 - 4 легкие
12. Что находится под контролем меридиана селезенки-поджелудочной железы

- 1 интеллект
- 2 мышление
- 3 память
- 4 зрение

13. Меридиан сердца держит под контролем

- 1 эмоции
- 2 состояние носоглотки
- 3 сознание
- 4 умственную активность

14. Количество активных точек на меридиане легких

- 1 5
- 2 7
- 3 11
- 4 15

15. Ло - пункт меридиана легких

- 1 P5
- 2 P9
- 3 P1
- 4 P7

16. Сигнальная точка меридиана легких

- 1 P1
- 2 P6
- 3 P7
- 4 P9

17. Количество активных точек по меридианам толстой кишки

- 1 10
- 2 15
- 3 20
- 4 32

18. Точка-послужник меридиана толстой кишки

- 1 Ci11
- 2 Ci2
- 3 Ci4
- 4 Ci16

19. Тонизирующая точка меридиана толстой кишки

- 1 Ci2
- 2 Ci4
- 3 Ci11
- 4 Ci16

20. Количество активных точек меридиана желудка

- 1 10
- 2 25
- 3 36
- 4 45

21. Сочувственная точка меридиана желудка

- 1 E41
- 2 V21
- 3 E34
- 4 RP6

22. Локальная металлотерапия

- 1 лечебное воздействие металлическими дисками, пластинами, браслетами, расположенными на определенных БАТ или зонах тела
- 2 воздействие на точки тела металлическими шариками
- 3 ручная прессация точек акупунктуры
- 4 термическое воздействие на точки акупунктуры

23. Цуботерапия -

- 1 лечебное воздействие металлическими дисками, пластинами, расположенными на определенных БАТ или зонах тела

2 воздействие на точки тела металлическими шариками

24. Точечный массаж -

- 1 воздействие на точки тела металлическими пластинами или дисками
- 2 воздействие на точки тела пучком игл
- 3 воздействие на точки тела металлическими шариками
- 4 ручная прессация точек акупунктуры

25. Методика су-джок: янь поверхность тела представляет

- 1 тыл кисти
- 2 ладонь
- 3 ухо
- 4 область поясницы

26. Методика су-джок: инь поверхность тела представляет

- 1 тыл кисти
- 2 ладонь
- 3 подошва стопы
- 4 ухо

27. Методика су-джок: гипотенор соответствует проекции

- 1 легкого
- 2 желудка
- 3 печени
- 4 сердца

28. Методика су-джок: тенор соответствует проекции

- 1 легкого
- 2 печени
- 3 сердца
- 4 желудка

29. Методика су-джок: большой палец кисти соответствует

- 1 сердце
- 2 легкое
- 3 голова
- 4 живот

30. При заболеваниях с синдромом холода иглы ставят

- 1 поверхностно
- 2 глубоко
- 3 на короткое время
- 4 на длительный срок

31. При пустоте энергии иглу вводят

- 1 медленно
- 2 быстро
- 3 острие иглы по ходу меридианы
- 4 острие иглы против хода меридианы

32. При полной энергии иглу вводят

- 1 быстро
- 2 медленно
- 3 против потока энергии
- 4 по ходу меридиана

33. При тонизирующем воздействии иглу извлекают

- 1 быстро
- 2 медленно

34. При седативном воздействии иглу извлекают

- 1 быстро
- 2 медленно

35. При тонизировании иглу вращают

- 1 против потока энергии
- 2 по потоку энергии

36. При седативном воздействии иглу вращают

- 1 против потока энергии
- 2 по потоку энергии

37. При боли тонизируют точки

- 1 больной стороны
- 2 противоположной стороны
- 3 одноименного меридиана
- 4 противоположенного меридиана

38. Микроиглотерапию не делают

- 1 при хронических заболеваниях
- 2 при анемии
- 3 при заболеваниях сердца
- 4 при шоке, кровотечении

39. Методом сильного раздражения достигают

- 1 тонизирующий эффект
- 2 седативный эффект

40. Не рекомендуется проводить иглоукалывание

- 1 при очень холодной погоде
- 2 при полнолунии
- 3 на восходе солнца
- 4 на закате

41. Применение метода "Цветения" противопоказано

- 1 после еды
- 2 натощак
- 3 при беременности
- 4 при головных болях

42. Вид мокса-терапии, применяемый у детей

- 1 тонкая волосаяная мокса
- 2 тепловая мокса
- 3 мокса-сигарета
- 4 чеснок-мокса

43. Точки сочувствия располагаются

- 1 на одноименных меридианах
- 2 на передне-срединном меридиане
- 3 на задне-срединном меридиане
- 4 на первой линии меридиана мочевого пузыря

44. Применение точек сочувствия эффективно

- 1 при острых заболеваниях
- 2 при хронических заболеваниях

45. Ножные меридианы инь

- 1 легкие
- 2 селезенка
- 3 почки
- 4 печень

46. Ручные меридианы инь

- 1 легкие
- 2 селезенка
- 3 сердце
- 4 перитард

47. Ручные меридианы янь

- 1 толстой кишки
- 2 желудка
- 3 тонкой кишки
- 4 мочевого пузыря

48. Ножные меридианы янь

- 1 толстой кишки
- 2 желудка
- 3 желчного пузыря

4 мочевого пузыря

49. Меридиан, регулирующий янь-энергию всех меридианов

- 1 задне-срединный
- 2 передне-срединный

50. Меридиан, регулирующий инь-энергию всех меридианов

- 1 задне-срединный
- 2 передне-срединный

51. Сигнальная точка меридиана легких

- 1 P1
- 2 Ci4
- 3 F3
- 4 V25

52. Сигнальная точка меридиана печени

- 1 Ci11
- 2 V2
- 3 F14
- 4 VB4

53. Время максимальной активности меридиана легких

- 1 9 - 11 часов
- 2 3 - 5 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 1 - 3 часов

54. Время максимальной активности меридиана желудка

- 1 9 - 11 часов
- 2 21 - 23 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 7 - 9 часов

55. Время максимальной активности меридиана сердца

- 1 5 - 7 часов
- 2 9 - 11 часов
- 3 11 - 13 часов
- 4 21 - 23 часов

56. Время максимальной активности меридиана мочевого пузыря

- 1 3 - 5 часов
- 2 11 - 13 часов
- 3 1 - 3 часов
- 4 15 - 17 часов

57. Время максимальной активности меридиана желчного пузыря

- 1 11 - 13 часов
- 2 23 - 1 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 3 - 5 часов

58. При заболеваниях лихорадкой (синдром жара) иглы ставят

- 1 поверхностно
- 2 глубоко
- 3 на короткое время
- 4 длительно

59. Иглоукалывание противопоказано

- 1 инфекционные заболевания
- 2 активный туберкулез легких
- 3 онкопатология I - II кл. гр.
- 4 онкопатология IV кл. гр.

60. После извлечения иглы точку укола массируют

- 1 при тонизировании
- 2 при седативном воздействии

61. Янцы-

- 1 метод прижигания
- 2 метод биопунктуры
- 3 метод аурикулотерапии
- 4 метод поверхностного иглоукалывания

62. Маоцы проводится-

- 1 пальцем
- 2 пучком игл (цветок)
- 3 полынной сигарой
- 4 методом одиночного укола

63. Мокса проводится-

- 1 пальцем рук
- 2 металлическими пластинами
- 3 полынной сигарой
- 4 пучком игл

64. Признаки избыточности меридиана легких-

- 1 температура, жар в ладонях, звонкий кашель, боли в горле, бронхиальная астма
- 2 хронические заболевания легких или заболевания с нарушением функции кожи, зуд, зябкость, хриплый кашель, боль в грудной клетке

65. Признаки недостаточности меридиана легких-

- 1 температура, жар в ладонях, звонкий кашель, боли в горле, бронхиальная астма
- 2 хронические заболевания легких или заболевания с нарушением функции кожи, зуд, зябкость, хриплый кашель, боль в грудной клетке

66. Синдром избыточности меридиана толстой кишки-

- 1 боли в верхних конечностях, спине, животе, напряжении мышц шейно-затылочной области, вздутие живота, запоры
- 2 понос, слабость в руках, бронхиальная астма

67. Синдром избыточности меридиана желудка.

- 1 боли в области передней поверхности грудной клетки, желудка и ног, вздутие живота, отрыжка, запор, чувство голода, сухость во рту, возбуждение, язва желудка, зубная боль
- 2 расстройство пищеварения (чувство полноты в животе, понос, рвота) онемение и чувство похолодания в области бедер, голеней, боли мышц живота, депрессия

68. Синдром недостаточности меридиана желудка.

- 1 боли в области передней поверхности грудной клетки, желудка и ног, вздутие живота, отрыжка, запор, чувство голода, сухость во рту, возбуждение, язва желудка, зубная боль
- 2 расстройство пищеварения (чувство полноты в животе, понос, рвота) онемение и чувство похолодания в области бедер, голеней, боли мышц живота, депрессия

69. Признаки недостаточности меридиана селезенки-поджелудочной железы.

- 1 плохая память
- 2 дневная сонливость
- 3 отеки
- 4 страсть к сладостям

70. Основные меридианы лечения заболеваний мочеполовой сферы.

- 1 почки
- 2 печень
- 3 желудок
- 4 легкие

71. Что находится под контролем меридиана селезенки-поджелудочной железы.

- 1 интеллект
- 2 мышление
- 3 память
- 4 зрение

72. Меридиан сердца держит под контролем.

- 1 эмоции
- 2 состояние носоглотки
- 3 сознание
- 4 умственную активность

73. Количество активных точек на меридиане легких.

- 1 5
- 2 7
- 3 11
- 4 15

74. Ло - пункт меридиана легких.

- 1 P5
- 2 P9
- 3 P1
- 4 P7

75. Сигнальная точка меридиана легких.

- 1 P1
- 2 P6
- 3 P7
- 4 P9

76. Количество активных точек по меридианам толстой кишки.

- 1 10
- 2 15
- 3 20
- 4 32

77. Точка-пособник меридиана толстой кишки.

- 1 Ci11
- 2 Ci2
- 3 Ci4
- 4 Ci16

78. Тонизирующая точка меридиана толстой кишки.

- 1 Ci2
- 2 Ci4
- 3 Ci11
- 4 Ci16

79. Количество активных точек меридиана желудка.

- 1 10
- 2 25
- 3 36
- 4 45

80. Сочувственная точка меридиана желудка.

- 1 E41
- 2 V21
- 3 E34
- 4 RP6

81. Локальная металлотерапия.

- 1 лечебное воздействие металлическими дисками, пластинами, браслетами, расположенными на определенных БАТ или зонах тела
- 2 воздействие на точки тела металлическими шариками
- 3 ручная прессация точек акупунктуры
- 4 термическое воздействие на точки акупунктуры

82. Цуботерапия -.

- 1 лечебное воздействие металлическими дисками, пластинами, расположенными на определенных БАТ или зонах тела
- 2 воздействие на точки тела металлическими шариками

83. Точечный массаж -.

- 1 воздействие на точки тела металлическими пластинами или дисками
- 2 воздействие на точки тела пучком игл
- 3 воздействие на точки тела металлическими шариками
- 4 ручная прессация точек акупунктуры

84. Методика су-джок: янь поверхность тела представляет.

- 1 тыл кисти

- 2 ладонь
- 3 ухо
- 4 область поясницы

85. Методика су-джок: инь поверхность тела представляет.

- 1 тыл кисти
- 2 ладонь
- 3 подошва стопы
- 4 ухо

86. Методика су-джок: гипотенор соответствует проекции.

- 1 легкого
- 2 желудка
- 3 печени
- 4 сердца

87. Методика су-джок: тенор соответствует проекции.

- 1 легкого
- 2 печени
- 3 сердца
- 4 желудка

88. Методика су-джок: большой палец кисти соответствует.

- 1 сердце
- 2 легкое
- 3 голова
- 4 живот

89. При заболеваниях с синдромом холода иглы ставят.

- 1 поверхностно
- 2 глубоко
- 3 на короткое время
- 4 на длительный срок

90. Меридиан, регулирующий инь-энергию всех меридианов.

- 1 задне-срединный
- 2 передне-срединный

91. Сигнальная точка меридиана легких.

- 1 P1
- 2 C14
- 3 F3
- 4 V25

92. Сигнальная точка меридиана печени.

- 1 C11
- 2 V2
- 3 F14
- 4 VB4

93. Время максимальной активности меридиана легких.

- 1 9 - 11 часов
- 2 3 - 5 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 1 - 3 часов

94. Время максимальной активности меридиана желудка.

- 1 9 - 11 часов
- 2 21 - 23 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 7 - 9 часов

95. Время максимальной активности меридиана сердца.

- 1 5 - 7 часов
- 2 9 - 11 часов
- 3 11 - 13 часов
- 4 21 - 23 часов

96. Время максимальной активности меридиана мочевого пузыря.

- 1 3 - 5 часов
- 2 11 - 13 часов
- 3 1 - 3 часов
- 4 15 - 17 часов

97. Время максимальной активности меридиана желчного пузыря.

- 1 11 - 13 часов
- 2 23 - 1 часов
- 3 17 - 19 часов
- 4 3 - 5 часов

98. При заболеваниях лихорадкой (синдром жара) иглы ставят.

- 1 поверхностно
- 2 глубоко
- 3 на короткое время
- 4 длительно

99. Иглоукалывание противопоказано.

- 1 инфекционные заболевания
- 2 активный туберкулез легких
- 3 онкопатология I - II кл. гр.
- 4 онкопатология IV кл. гр.